



# CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS AO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS PARA O ANO DE 2021

## MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

Código: 102

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. A CONSTATAÇÃO, EM QUALQUER ÉPOCA, DE IRREGULARIDADE OU FRAUDE, IMPLICARÁ NO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO OU NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CONCURSO OU DO CURSO, CASO ESTE TENHA SE INICIADO, BEM COMO NA DEMISSÃO DA CORPORACÃO A QUALQUER ÉPOCA, RESGUARDADO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EM CASO DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS ILÍCITOS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PARA SI OU PARA OUTROS, SERÁ ACIONADA A AUTORIDADE POLICIAL PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS, CONSIDERANDO OS CRIMES DESCRITOS NOS TIPOS PENAS PREVISTOS NOS ARTIGOS 299 E 311.A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

2. Leia as Instruções Gerais de Redação antes de começá-la.

3. O candidato **NÃO** poderá levar consigo o Caderno de Questões nem o Rascunho da Redação.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS** da Prova Objetiva, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspás e autoria, a seguinte frase:

**“Nós perdoamos, mas não esquecemos.”** Nelson Mandela

5. A duração das provas é de **4 horas**, já incluído o tempo destinado à identificação do candidato e ao preenchimento das Folhas de Respostas.

6. O tempo de sigilo, ou seja, o tempo mínimo de permanência do candidato em sala de aula será de **3h** após o início da prova, sob pena de eliminação.

7. Ao receber as **Folhas de Respostas:**

- confira seu nome, número de inscrição e cargo.
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

8. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas** da **Prova Objetiva:**

- |    | A                                   | B                                   | C                                   | D                        |                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;                                                                             |
| 02 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;          |
| 03 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | • assinale somente uma alternativa em cada questão.                                                                          |
|    |                                     |                                     |                                     |                          | • Sua resposta <b>NÃO</b> será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras. |

9. As **Folhas de Respostas** não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.

**Poderá ser eliminado do Concurso o candidato que:** tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso Público, por qualquer meio; portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial e de licença para o respectivo porte; portar, mesmo que desligados, ou fizer uso, durante o período de realização das provas, quaisquer equipamentos eletrônicos; fazer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações; deixar de atender às normas contidas no Caderno de Questões e nas Folhas de Respostas e demais orientações e instruções expedidas pela Fundep, durante a realização das provas; deixar de assinar a prova conforme edital ou orientação contida na Folha de Respostas da Prova Objetiva; deixar de transcrever a frase que consta na capa da prova.

**Os gabaritos e as questões da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos:**  
<[www.gestaodeconcursos.com.br](http://www.gestaodeconcursos.com.br)> e <[www.bombeiros.mg.gov.br](http://www.bombeiros.mg.gov.br)>

# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Este caderno consta de **50 (cinquenta) questões** objetivas, sendo **5 (cinco)** questões de **Direitos Humanos** e **45 (quarenta e cinco)** questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

Use o espaço abaixo e os espaços em branco da sua prova para rascunho, exceto a folha que corresponde ao GABARITO (Versão do Candidato) e o verso dela.

**QUESTÃO 1**

Considere as afirmativas a seguir sobre a proteção ao idoso no Direito brasileiro.

- I. É assegurada prioridade especial aos idosos maiores de 80 anos, atendendo as suas necessidades sempre e preferencialmente em relação aos demais idosos.
- II. O Estatuto do Idoso está contido em lei federal e se destina a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.
- III. Os maiores de 80 anos têm preferência especial sobre todos os demais idosos em todo atendimento de saúde, salvo em caso de emergência.

Segundo o que dispõe o Estatuto do Idoso, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II, apenas.
- D) I, II e III.

**QUESTÃO 2**

Em depoimento intitulado “O racismo não me derrubou”, dado a uma revista nacional, a cantora Elza Soares, mulher negra conhecida por seu talento, sua história de vida e sua luta contra o preconceito, relatou que não foi admitida em um hotel em razão da cor de sua pele: “[...] me disseram que não havia reserva em meu nome e não me deixaram ficar. Mas eu sabia que havia vaga. Foi discriminação mesmo.”. (VEJA. ed. 2698, ano 53, n.32, 05/08/20, p.87).

Considerando o teor do relato e o que dispõe a lei que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, é correto afirmar que, em tese, na hipótese

- A) não há caracterização de crime, porque o ato de recusa ocorreu em estabelecimento privado regido pelas regras da livre iniciativa.
- B) há caracterização do crime, expressamente previsto na mencionada lei, de impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou estabelecimento similar.
- C) só se caracterizaria o crime se a recusa de hospedagem fosse expressamente fundamentada em motivo de discriminação de cor ou etnia.
- D) não há configuração de crime, na medida em que a recusa não foi contestada no momento e de modo expreso pela cantora.

**QUESTÃO 3**

O § 1º do art. 5º da Constituição brasileira de 1988 determina que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A interpretação dessa norma e do que mais dispõe o referido artigo a respeito de sua eficácia leva a concluir que os direitos fundamentais

- A) devem ser aplicados de modo a se evitarem colisões entre si.
- B) são sempre definidos por normas constitucionais de eficácia plena.
- C) às vezes, dependem, segundo seus enunciados, de legislação posterior que garanta sua aplicabilidade.
- D) não podem ser interpretados de modo a se reduzir a proteção que veiculam.

**QUESTÃO 4**

Segundo a Constituição da República, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica. Trata-se da garantia da escusa de consciência, direito que autoriza o indivíduo a justificar o não cumprimento de uma obrigação legal a todos imposta por razões religiosas, filosóficas ou políticas.

Embora considerado fundamental, o referido direito não prevalecerá se

- A) o indivíduo justificar o não cumprimento da obrigação invocando crença ou convicção não amparadas pelos costumes sociais.
- B) for invocado em período de calamidade pública.
- C) não for comprovado que a convicção alegada faça parte do histórico do indivíduo.
- D) o indivíduo se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei.

**QUESTÃO 5**

Considere as afirmativas a seguir sobre o crime de feminicídio.

- I. Trata-se de espécie de homicídio qualificado, cuja pena é maior do que a do homicídio simples.
- II. Há feminicídio quando o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.
- III. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica ou familiar ou se dá mediante traição, emboscada ou dissimulação.

Conforme a lei que prevê o feminicídio, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

**MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA****QUESTÃO 6**

Em relação ao exame físico otoneurológico, alguns testes são rotineiros. A prova de Unterberger (ou prova de Fukuda) é considerada alterada quando o paciente se desvia 45° ou mais enquanto está marchando no mesmo lugar com os olhos fechados. O teste do impulso cefálico avalia o reflexo vestibulo-ocular e é considerado positivo quando há a presença de sacada. Já o teste de Romberg avalia o equilíbrio estático e é positivo quando há queda ou tendência de queda.

Sobre os testes citados, assinale a alternativa incorreta.

- A) O teste de Romberg pode ser normal em pacientes com disfunção vestibular crônica.
- B) Nas lesões vestibulares agudas unilaterais, o paciente se desvia para o lado do labirinto hipoativo durante a prova de Unterberger.
- C) O teste do impulso cefálico permite testar apenas os dois canais semicirculares laterais (ou horizontais).
- D) No teste do impulso cefálico, quando o paciente apresenta sacada corretiva após o movimento da cabeça da direita para esquerda, sugere-se perda da função vestibular esquerda.

**QUESTÃO 7**

Os tumores de glândulas salivares têm como principal característica a grande variedade de apresentações tanto na histologia quanto na localização anatômica e na região geográfica. Algumas características ajudam a diferenciar os tipos de tumores que acometem as glândulas salivares mais comumente. Sobre as características dos tumores de glândulas salivares, analise as afirmativas a seguir.

- I. O tumor de Warthin é um tumor benigno que só acontece nas glândulas parótidas e muito mais comum em homens (25:1).
- II. O adenoma pleomórfico é o tumor mais comum de glândulas salivares e, apesar de benigno, tem crescimento rápido e há dor à palpação.
- III. O adenocarcinoma de células acinares tem crescimento rápido e, apesar de ser um tumor maligno, raramente gera metástase ou recidiva após tratamento cirúrgico.
- IV. O carcinoma adenoide cístico é o tumor maligno mais comum das glândulas intraorais e tem tendência à invasão perineural, podendo causar paralisia facial quando na parótida.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e IV, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.

**QUESTÃO 8**

A fístula líquórica nasal (FLN) decorre de comunicação entre o espaço subaracnóideo e os seios da face ou cavidade nasal. A FLN pode ter origem traumática ou não traumática, esta com causas congênitas, tumorais, hipertensivas, inflamatórias, entre outras.

Sobre o diagnóstico e a localização das FLNs, assinale a alternativa correta.

- A) A cisternotomografia é o método de escolha para o diagnóstico topográfico da FLN.
- B) O uso da glicofita para aferir a glicose no líquido nasal nunca é positivo na ausência da FLN.
- C) Quando indicado o tratamento cirúrgico para FLN, não há necessidade de manter dreno lombar no pós-operatório para maiores taxas de sucesso.
- D) O local visível de drenagem óssea corresponde ao orifício de drenagem meníngeo, sendo desnecessário explorar ou alargar o local após a identificação do orifício ósseo.

**QUESTÃO 9**

O schwannoma do VIII nervo, também chamado de schwannoma vestibular, é um tumor benigno de crescimento lento com origem, geralmente, no conduto auditivo interno (CAI).

Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta.

- A) Diante das terapias existentes, cirúrgicas e radioterápicas, não há preservação da audição a longo prazo na maioria dos casos.
- B) Há relação direta entre o tamanho do tumor e a perda auditiva, sendo que tumores intracanaliculares raramente se manifestam com hipoacusia.
- C) Basicamente, há três vias de acesso para o CAI e para o ângulo ponto cerebelar: retrossigmoide, translabiríntica e da fossa média (ou suprapetrosa).
- D) Apesar de os exames de imagem serem padrão-ouro para avaliação do schwannoma vestibular, a audiometria de tronco cerebral (ou potencial evocado de tronco encefálico) tem sensibilidade próxima de 95% no diagnóstico de lesões retrococleares.

### QUESTÃO 10

A perda auditiva na infância tem grande impacto em todas as esferas da vida de uma criança, em especial no desenvolvimento da linguagem social e desenvolvimento acadêmico. Logo, o diagnóstico e as intervenções necessárias devem ocorrer nos primeiros meses de vida.

Com relação à perda auditiva e seu diagnóstico em recém-nascidos e lactentes, assinale a alternativa incorreta.

- A) Dentre todas as doenças congênitas, a perda auditiva é a mais comum.
- B) As emissões otoacústicas evocadas avaliam o sistema auditivo pré-neural, especificamente as células ciliadas externas da cóclea.
- C) O reflexo cócleo-palpebral não é uma resposta auditiva comportamental confiável no primeiro mês de vida.
- D) Os procedimentos fisiológicos (imitanciométrie, emissões otoacústicas, potencial evocado auditivo de tronco encefálico, potencial evocado auditivo de estado estável) não são suficientes para avaliar a função auditiva como um todo.

### QUESTÃO 11

A rinossinusite crônica (RSC) é um processo inflamatório que acomete a mucosa nasossinusal por um período maior do que 12 semanas, havendo lesão da mucosa que não se regenerou após um processo inflamatório e / ou infeccioso agudo. Sobre a RSC, as doenças e os fatores correlatos à ela, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) As variações anatômicas como concha média bolhosa, desvio de septo e de processo uncinado são causas bem definidas de RSC.
- ( ) A intolerância ao AAS (ácido acetilsalicílico) é uma reação alérgica mediada por imunoglobulina E, que se manifesta com broncoespasmo e rinorreia e é associada à RSC com polipose nasossinusal em 36 a 96% dos casos.
- ( ) São achados relativamente comuns na fibrose cística: RSC com polipose na infância, pseudomucocele maxilar bilateral e hipoplasia dos seios frontais e esfenoidais.
- ( ) A síndrome de Young caracteriza-se por RSC, pneumopatia e azoospermia devido a alterações ultraestruturais dos cílios da mucosa respiratória e dos espermatozoides.
- ( ) O uso de doses baixas de macrolídeos por tempo prolongado está indicado na maioria dos casos de RSC, com ou sem polipose nasossinusal.

Assinale a sequência correta.

- A) F V V F V
- B) V F F F V
- C) V V F V F
- D) F F V V F

### QUESTÃO 12

Sobre a paralisia facial periférica (PFP), assinale a alternativa correta.

- A) O envolvimento de outros pares cranianos e a PFP bilateral não são critérios de exclusão da PFP de Bell.
- B) A eletroneurografia compara o número de fibras nervosas funcionantes de um lado com o outro da face, sendo que valores abaixo de 10% indicam mau prognóstico na PFP de Bell.
- C) A eletromiografia é teste de estimulação elétrica indicado até os primeiros três meses de evolução da doença.
- D) Dentre as etiologias virais, o vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV) pode causar PFP, mas não isoladamente.

### QUESTÃO 13

O acesso endoscópico à região selar e parasselar tem permitido o tratamento cirúrgico de tumores hipofisários com baixas taxas de morbidade e mortalidade.

Sobre os tumores de hipófise e seu tratamento, assinale a alternativa incorreta.

- A) Muitos tumores hipofisários, especialmente os prolactinomas, são tratados apenas clinicamente.
- B) Os adenomas hipofisários não secretores e secretores do hormônio adrenocorticotrófico e de hormônio de crescimento volumosos exigem tratamento cirúrgico.
- C) Os adenomas hipofisários são operados via transesfenoidal em apenas 40% dos casos, porque o tamanho e a pneumatização do seio esfenoidal são fatores limitantes.
- D) O diabetes insípido é a complicação endócrina mais frequente das cirurgias endoscópicas à região selar e parasselar, e geralmente é transitório.

### QUESTÃO 14

As complicações orbitárias das rinossinusites infecciosas ocorrem por duas vias de disseminação: passagem direta por deiscências da lâmina papirácea ou disseminação retrógrada das veias orbitárias. Geralmente, são associadas à infecção dos seios maxilares ou etmoidais.

Considerando as características das complicações orbitárias das rinossinusites, assinale a alternativa incorreta:

- A) Em crianças, a dor geralmente é sinal de alarme precoce.
- B) Apenas 10% das inflamações pré-septais são complicações das rinossinusites, sendo causas frequentes picadas de inseto, traumas e conjuntivites.
- C) O tratamento envolve internação e antibioticoterapia endovenosa de amplo espectro, casos excepcionais podem ser tratados sem internação e com antibióticos via oral.
- D) Níveis elevados de proteína C reativa parecem estar associados a desfechos mais graves, podendo indicar tratamento inicial mais agressivo.

### QUESTÃO 15

As complicações intracranianas das otites médias são pouco frequentes, mas ainda têm elevada taxa de mortalidade. A faixa etária mais acometida é a de indivíduos jovens e a associação de mais de uma complicação é relativamente comum. Considere as seguintes afirmativas sobre as complicações intracranianas das otites médias.

- I. A meningite é mais comum em crianças e, quando decorrente de otite média aguda, deve ser tratada com antibioticoterapia parenteral, dexametasona e mastoidectomia.
- II. A tromboflebite do seio sigmoide sem componente supurativo pode-se manifestar apenas com febre.
- III. O abscesso epidural pode ser assintomático e só diagnosticado no momento da cirurgia ou incidentalmente, por exame de imagem.
- IV. O abscesso encefálico é a complicação intracraniana mais comum e ocorre mais frequentemente no lobo temporal e cerebelo.
- V. O empiema subdural é uma emergência neurocirúrgica que deve ser suspeitada em casos de deterioração neurológica, convulsões ou hemiplegia com otite média.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e V, apenas.
- B) I, IV e V, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) II, III, V, apenas.

### QUESTÃO 16

A otite externa necrotizante é uma infecção grave que começa no conduto auditivo externo (CAE) e se estende à base do crânio, sendo a *Pseudomonas aeruginosa* o agente causador em até 98% dos casos. Sobre as otites externas necrotizantes, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) O início do quadro é como uma otite externa difusa aguda, o que pode retardar o diagnóstico.
- ( ) Geralmente há sinais sistêmicos como febre ou taquicardia.
- ( ) A membrana timpânica está usualmente intacta.
- ( ) Um dos pontos cardinais diagnósticos é o envolvimento de pares cranianos.
- ( ) A imagem por ressonância magnética é o exame mais importante para avaliar a extensão da doença, enquanto a tomografia computadorizada está indicada para a avaliação da evolução da doença.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V V F
- B) V V V F V
- C) F V F V F
- D) F F V V V

### QUESTÃO 17

A papilomatose respiratória recorrente (PRR) é o tumor benigno mais comum na laringe de crianças.

Sobre a PRR, assinale a alternativa incorreta.

- A) Crianças com diagnóstico de PRR antes de completarem três anos são mais propensas a serem submetidas a mais de quatro procedimentos cirúrgicos por ano.
- B) Crianças com diagnóstico de PRR antes de completarem três anos são quase duas vezes mais susceptíveis a terem dois ou mais locais anatômicos afetados do que crianças com diagnóstico mais tardio.
- C) Há associação bem estabelecida entre a infecção cervical da mãe pelo HPV e a incidência de PRR, logo, o parto cesáreo está indicado como meio de prevenir a PRR nesses casos.
- D) A rouquidão é a principal manifestação clínica da PRR e o estridor é, com frequência, o segundo sintoma clínico a se desenvolver.

### QUESTÃO 18

O hiperparatireoidismo, resultado da hipersecreção persistente do hormônio paratireoide, tem diferentes causas e muitas vezes é pouco sintomático. O tratamento cirúrgico é indicado seguindo critérios específicos.

Com relação ao hiperparatireoidismo e seu tratamento cirúrgico, assinale a alternativa incorreta.

- A) A insuficiência renal crônica é a condição mais comumente associada ao hiperparatireoidismo secundário.
- B) O carcinoma da paratireoide é causa frequente de hiperparatireoidismo primário (40 a 50%) e seu diagnóstico é facilmente confirmado pelo exame histopatológico.
- C) São diagnósticos diferenciais do hiperparatireoidismo: mieloma múltiplo, sarcoidose, hipertireoidismo, hipervitaminoses A e D e imobilização prolongada.
- D) Para a localização pré-operatória, o mapeamento com tecnécio 99 m/ sestamibi apresenta os melhores índices de sensibilidade, podendo ocorrer resultado falso-positivo, principalmente na presença de doença nodular tireoidiana.

### QUESTÃO 19

Além da indicação estética, a rinoplastia vem sendo indicada com frequência para tratamento de obstrução nasal, como por insuficiência de válvula nasal. Sobre a insuficiência da válvula nasal e sua abordagem, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) As principais alterações anatômicas responsáveis são: colapso do rebordo alar, colapso do dorso nasal cartilaginoso, desvio septal alto, hipertrofia de cornetos inferiores, nariz com ponta mergulhante, columela alargada e desvio septal caudal.
- ( ) Exames de imagem, rinomanometria e nasofibroscoopia são necessários para sua avaliação.
- ( ) Raramente é necessária a remoção do excesso de tamanho vertical do septo caudal para correção do desvio septal caudal.
- ( ) São fatores de risco para desenvolver insuficiência de válvula interna no pós-operatório de uma rinoplastia, principalmente quando abordado o dorso nasal: ossos próprios curtos, pele fina e idade avançada.
- ( ) Enxertos do tipo *spreader grafts* são os mais utilizados para manejo da insuficiência de válvula nasal externa.
- ( ) O *strut* de *crus* lateral geralmente é realizado com cartilagem septal e tem utilidade na insuficiência da válvula nasal interna.

Assinale a sequência correta.

- A) F V V F V V
- B) V F F V F F
- C) V V F F V V
- D) F F V V F F

### QUESTÃO 20

A otosclerose é uma doença primária do osso e os seus efeitos são secundários a sua extensão e localização, assim como sua atividade metabólica.

Sobre a otosclerose, assinale a alternativa correta.

- A) O envolvimento histológico unilateral ocorre entre 1 e 5% dos casos e não se correlaciona bem com estudos clínicos, que apontam perda auditiva unilateral em quase metade dos casos.
- B) São achados comuns na otosclerose: sinal de Schwartze e tonturas.
- C) A terapia medicamentosa pode reverter o componente condutivo da perda auditiva oriundo da fixação da platina do estribo.
- D) Discriminação vocal menor que 65% pode indicar que o fechamento aéreo ósseo pode ser de pouco benefício para o paciente.

### QUESTÃO 21

Analise as afirmativas a seguir sobre as causas infecciosas de perdas auditivas neurossensoriais adquiridas.

- I. Na caxumba, geralmente a perda auditiva é unilateral, de evolução rápida, profunda em frequências agudas e comumente irreversível.
- II. No sarampo, a perda auditiva neurossensorial é geralmente bilateral, concomitante ao *rash* cutâneo, pode ser assimétrica, predomina nas altas frequências e é comumente irreversível.
- III. A síndrome de Ramsay Hunt se caracteriza por vesículas dolorosas em pavilhão auditivo e conduto auditivo externo, paralisia facial periférica e, na maioria dos casos, sintomas otoneurológicos como vertigem, zumbido, hipoacusia.
- IV. As meningites bacterianas causadas pelo *Streptococcus pneumoniae* são mais frequentes, mas a surdez permanente tem maior probabilidade de ocorrer nos casos de infecção pela *Neisseria meningitidis*.
- V. A sífilis congênita e adquirida podem levar à surdez neurossensorial, sendo que na congênita, a perda auditiva pode ser precoce (ao nascimento até os três anos de idade) ou tardia (dos oito aos 20 anos de idade).

São corretas as afirmativas

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e V, apenas.
- C) III, IV e V, apenas.
- D) I, II, III e V, apenas.

### QUESTÃO 22

A tontura é um dos sintomas mais comuns na prática clínica. A neurite vestibular é um quadro de vertigem intensa aguda comumente diagnosticada em pronto atendimentos.

São aspectos importantes nos quadros de vertigens agudas, exceto:

- A) O *head impulse test* evidencia um reflexo vestibulo-ocular alterado quando se testa o lado acometido pela neurite vestibular.
- B) São diagnósticos diferenciais nos quadros de vertigem aguda sem sintomas auditivos: neuronite vestibular, acidente vascular encefálico e esclerose múltipla.
- C) Sintomas auditivos associados à síndrome vestibular aguda espontânea, sem história prévia de vertigem, deve ser sinal de alerta para doença neurológica.
- D) O corticoide não mostrou evidência de melhorar o prognóstico da neurite vestibular, enquanto o Aciclovir parece trazer benefícios adicionais.

### QUESTÃO 23

A doença de Menière tem fisiopatologia ainda indefinida e seu diagnóstico eminentemente clínico. Entretanto, alguns exames podem ser úteis para a avaliação dos pacientes com suspeita dessa doença.

Sobre o diagnóstico da doença de Menière, assinale a alternativa incorreta.

- A) Na eletrococleografia, o parâmetro de maior confiabilidade é a relação percentual entre a amplitude do potencial de somação e a amplitude do potencial de ação.
- B) A ressonância nuclear magnética não tem utilidade para o diagnóstico da hidropsia endolinfática.
- C) Dieta, diuréticos e supressores labirínticos podem estar indicados para o tratamento da vertigem.
- D) A gentamicina intratimpânica é uma opção terapêutica para controle da vertigem incapacitante, mas com efeito cocleotóxico em 15 a 25% dos casos.

### QUESTÃO 24

As faringotonsilites (FT) são infecções das vias aéreas superiores bastante comuns. As tonsilas palatinas têm susceptibilidade à aderência bacteriana do *Streptococcus pyogenes* beta-hemolítico do grupo A (GAS) que pode levar a complicações locorreionais e imunológicas.

Com relação às FT e à tonsilectomia, assinale a alternativa correta.

- A) Um dilema na indicação de tonsilectomia para FT bacteriana de repetição é o difícil diagnóstico clínico diferencial com faringotonsilite viral, que representa 60% dos casos de FT.
- B) A tonsilectomia está sempre indicada nos casos de abscesso peritonsilar, porque a taxa de recorrência desses abscessos é relativamente alta.
- C) O teste rápido para identificação do GAS tem especificidade baixa, mas alta sensibilidade.
- D) Paciente com episódio único de febre reumática não tem risco maior de apresentar recorrência caso apresente outro episódio de faringotonsilite por GAS.

### QUESTÃO 25

A laringite crônica é caracterizada por um processo inflamatório granulomatoso resultado de resposta inflamatória local e dano tecidual causado principalmente por infecções crônicas.

Sobre as laringites crônicas infecciosas, assinale a alternativa incorreta.

- A) A tuberculose é a causa mais frequente de lesão granulomatosa de laringe.
- B) O acometimento do nervo laríngeo recorrente por comprometimento mediastinal é forma rara de comprometimento laríngeo pela tuberculose.
- C) As lesões laríngeas da leishmaniose, no nosso meio, têm predileção pela supraglote, principalmente epiglote, ligamentos ariepiglóticos e aritenoides.
- D) O comprometimento laríngeo na paracoccidiodomicose ocorre como evolução de lesões que têm a boca e a laringe como porta de entrada.

### QUESTÃO 26

Os linfomas são a segunda doença maligna mais comum da cabeça e pescoço.

Com relação aos linfomas, assinale a alternativa correta.

- A) Os linfomas de Hodgkin correspondem a 90% dos linfomas de cabeça e pescoço.
- B) O linfoma nasal primário e o linfoma nasofaríngeo são semelhantes de acordo com a imunofenotipagem e apresentam prognóstico semelhante, apesar de localização anatômica diferente.
- C) Em casos de difícil diagnóstico, o achado do EBV (vírus Epstein Barr) por hibridização *in situ* não favorece o diagnóstico e, portanto, a pesquisa de EBV na medula óssea não deve ser indicada.
- D) Morte por sepse pode ocorrer, em casos avançados, se não for instituída a antibioticoterapia e a desbridamento cirúrgica de tecido necrótico antes do início da radioterapia / quimioterapia.

### QUESTÃO 27

Anosmia é a ausência da função olfatória, e hiposmia é a redução da função olfatória. Parosmia é uma percepção olfatória alterada na presença de um estímulo, e fantosmia é a percepção olfatória na ausência de estímulo.

Com relação aos distúrbios do olfato, assinale a alternativa incorreta.

- A) A perda da função olfatória está presente em mais de 50% dos indivíduos com mais de 60 anos de idade.
- B) Exames de imagem, como a tomografia computadorizada, estão indicados nos casos de anosmia sem etiologia condutiva óbvia ou típica pós-viral.
- C) Testes olfatórios objetivos, como o *Smell Identification Test* (Sensonics, Inc.), são de difícil realização e não validados, logo só são empregados em centros de pesquisa.
- D) As doenças neurológicas, como a doença de Alzheimer e a esclerose múltipla devem ser consideradas no diagnóstico diferencial.

### QUESTÃO 28

Cistos do ducto tireoglosso são massas cervicais medianas que podem surgir em qualquer ponto ao longo do trajeto de descida da tireoide.

Sobre os cistos do ducto tireoglosso, assinale a alternativa incorreta.

- A) Não se movem com a deglutição e protrusão da língua, diferentemente dos cistos dermóides.
- B) A ultrassonografia é mandatória para documentar o tecido tireoidiano na sua localização normal, visto que podem conter todo o tecido tireoidiano funcional.
- C) A remoção da porção central do osso hióide deve ser realizada durante o tratamento cirúrgico para minimizar recorrências.
- D) Durante o tratamento cirúrgico, há o risco de lesão dos nervos laríngeos superiores e do hipoglosso.

### QUESTÃO 29

As maloclusões dentárias têm etiologia multifatorial, sendo a respiração oral uma condição importante que influencia o complexo dentoalveolar muscular facial. Sobre esse tema, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) A maloclusão de classe III de Angle se dá quando o primeiro molar inferior está posicionado distalmente (para trás) em relação ao primeiro molar superior, o que é observado com frequência em respiradores orais.
- ( ) A língua constantemente rebaixada em crianças respiradoras orais deixa de estimular o crescimento maxilar transversal.
- ( ) O indivíduo respirador oral com ausência de selamento labial pode coexistir com qualquer tipo de maloclusão.
- ( ) As alterações morfodimensionais no espaço faríngeo das vias aéreas podem interferir no processo dinâmico do crescimento e desenvolvimento dentofacial.

Assinale a sequência correta.

- A) F V F F
- B) V F V V
- C) V V F F
- D) F V V V

### QUESTÃO 30

A disfunção velofaríngea (DVF) engloba desordens de causas variadas, envolvendo o mecanismo do esfíncter velofaríngeo e afeta a qualidade do som e a ressonância da voz. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

- I. A fenda palatina é a condição anatômica congênita mais comum de DVF.
- II. A aprendizagem errônea não pode ser considerada causa de DVF.
- III. A inadequação velofaríngea pode ocorrer em 1 a cada 1.500 adenoidectomias.
- IV. A incompetência velofaríngea pode ocorrer após cirurgias de base de crânio, tumores envolvendo o forame jugular e o nervo vago.
- V. O exame endoscópico da fala permite observar alguns padrões de fechamento velofaríngeo, sendo o fechamento sagital o mais comum.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e IV, apenas.
- B) I, III e V, apenas.
- C) II, III e V, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.

### QUESTÃO 31

Sobre os hemangiomas faciais e de cabeça e pescoço na infância, assinale a alternativa correta.

- A) Atualmente estão sendo abordados de forma mais conservadora no início da infância.
- B) O propranolol é uma terapia adjuvante à cirurgia para lesões na face que prejudicam a função.
- C) A terapia com *laser* corante pulsado não reduz o volume das lesões de face.
- D) O corticoide oral, de modo intermitente e a longo prazo, está indicado em casos excepcionais de comprometimento de via aérea.

### QUESTÃO 32

O desenvolvimento da orelha interna inicia-se cedo na embriogênese, sendo que o feto humano já é capaz de ouvir entre dois e meio e três meses antes do seu nascimento. A maior parte das malformações da orelha interna acontece quando a formação do labirinto membranoso é interrompida no primeiro trimestre da gravidez.

Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta.

- A) A maioria das crianças com PANS bilateral congênita profunda apresenta alguma alteração tomográfica das orelhas internas.
- B) A síndrome do aqueduto vestibular alargado tipicamente é bilateral e muitas vezes associada a outras anomalias radiográficas da orelha interna, e crianças afetadas podem apresentar diferentes graus de comprometimento auditivo.
- C) O implante coclear tem sido muito bem-sucedido em adultos e crianças com aquedutos vestibulares alargados com PANS profunda.
- D) A forma mais comum de malformação coclear decorre da interrupção do desenvolvimento do botão coclear na sétima semana de gestação, resultando em uma cóclea com apenas 1,5 volta, chamada deformidade de Mondini.

### QUESTÃO 33

Com relação à avaliação e conduta nas vias aéreas pediátricas, assinale a alternativa incorreta.

- A) A maioria das paralisias unilaterais de prega vocal não iatrogênicas diagnosticadas no período neonatal persistem, sendo incomum a recuperação espontânea.
- B) Com frequência, o diagnóstico da paralisia de pregas vocais (bilateral) ao nascimento é o sintoma que leva ao diagnóstico de doenças neuromusculares.
- C) Na paralisia unilateral de prega vocal que cursa com aspiração e disfonia, a injeção de compostos injetáveis ou gordura autóloga pode ser útil.
- D) Todos os pacientes com membrana laríngea têm indicação de triagem genética e avaliação cardíaca completa.

### QUESTÃO 34

Embora as fraturas faciais sejam relativamente raras na população pediátrica, quando ocorrem, é comum o envolvimento do nariz.

Em relação as fraturas do nariz e do septo nasal, assinale a alternativa correta.

- A) Na criança, a força do traumatismo é mais difusa com menor risco de lesão da cartilagem e do pericôndrio.
- B) O hematoma septal é menos comum na criança do que no adulto, sendo mais frequentemente unilateral.
- C) A evacuação de um hematoma ou abscesso septal em crianças pode ser realizada com aspiração por agulha.
- D) As fraturas por impacto lateral são mais comuns e têm melhor prognóstico do que as fraturas por impacto frontal.

### QUESTÃO 35

O osso temporal é uma estrutura complexa e com múltiplas relações anatômicas, sendo alvo de inúmeros procedimentos cirúrgicos. O conduto auditivo interno (CAI) é um canal com cerca de 8 mm de comprimento, situa-se na face posteromedial do rochedo (porção petrosa do osso temporal) e contém o sétimo e oitavo nervos cranianos, sendo importante dominar sua anatomia.

Sobre o CAI, assinale a alternativa incorreta.

- A) No acesso cirúrgico pela mastoide, identifica-se o fundo do CAI logo após a remoção completa da parede medial do vestíbulo.
- B) A *Bill bar* é uma crista óssea horizontal que divide o fundo do CAI em andares superior e inferior.
- C) Pela fossa média, observa-se um ângulo de cerca de 60° entre a direção do canal semicircular superior e a direção do CAI.
- D) Existem quatro troncos nervosos no interior do CAI, sendo que o nervo facial se encontra na porção anterior do andar superior.

### QUESTÃO 36

A otite média com efusão (OME) é muito comum e é definida como presença de fluido na orelha média na ausência de processo infeccioso agudo. Sobre a OME, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as afirmativas falsas.

- ( ) A deficiência auditiva costuma ser leve e transitória na maioria das crianças e, portanto, mesmo crônica, não tem efeito significativo no desenvolvimento de linguagem e fala.
- ( ) O tubo de ventilação está indicado na presença de bolsa de retração posterossuperior ou atelectasia adesiva independentemente do nível auditivo.
- ( ) Na OME crônica bilateral com nível auditivo maior ou igual a 40 dB no melhor lado, indica-se tratamento clínico com antibióticos e ciclos de corticoide sistêmico.
- ( ) Nos casos de OME, o prognóstico é inversamente proporcional ao tempo de evolução.

Assinale a sequência correta.

- A) F V F V
- B) V F V V
- C) F F V F
- D) V V F F

### QUESTÃO 37

Métodos de imagem, como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância nuclear magnética (RNM), são muito importantes na avaliação das doenças nasossinusais.

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionado a afecção com os achados nos exames de imagem correspondentes.

#### COLUNA I

1. Estesioneuroblastoma
2. Rinossinusite fúngica não invasiva
3. Rinossinusite fúngica invasiva
4. Hemangioma
5. Carcinoma de células escamosas
6. Angiofibroma

#### COLUNA II

- ( ) Opacificação dos seios da face com erosão óssea e / ou infiltração de partes moles sendo o conteúdo hiperdenso na TC.
- ( ) Lesão expansiva da parede posterior da cavidade nasal alargando a fossa pterigopalatina, com intensidade de sinal heterogênea em T1 e T2 com áreas de ausência de sinal e intenso realce pós-contraste.
- ( ) Lesão expansiva com centro no teto da cavidade nasal, com componente superior e inferior à placa cribiforme.

- ( ) Lesão expansiva lobulada podendo provocar remodelamento ósseo, além de intenso realce pós-contraste na TC.
- ( ) Lesão expansiva irregular com realce heterogêneo pós-contraste com destruição óssea e necrose na TC.
- ( ) Material hiperdenso com calcificações lineares em seu interior na TC e material com hipossinal em T1 e T2 com realce mucoso periférico na RNM, acometendo seio único.

Assinale a sequência correta.

- A) 3 6 1 4 5 2
- B) 5 4 1 6 2 3
- C) 2 6 1 4 5 3
- D) 3 1 4 6 5 2

### QUESTÃO 38

Com relação ao estudo da mobilidade e da função vibratória das pregas vocais, assinale a alternativa incorreta.

- A) A videolaringoscopia permite a avaliação da integridade da relação dinâmica e funcional do corpo e a cobertura das pregas vocais.
- B) A videoquimografia não tem utilidade nos casos de aperiodicidade da onda mucosa das pregas vocais.
- C) A fonação inspiratória forçada é manobra que ajuda no diagnóstico das alterações de cobertura das pregas vocais e, junto com a estroboscopia, avalia melhor a lâmina própria.
- D) A eletromiografia da laringe é útil na diferenciação das paralisias laringeas das fixações.

### QUESTÃO 39

Sobre as cirurgias nasais, assinale a alternativa incorreta.

- A) Independentemente da técnica de redução de conchas nasais inferiores, a exposição do tecido ósseo deve ser evitada.
- B) A turbinoplastia inferior com a neurectomia nasal posterior ou seletiva são opções cirúrgicas em pacientes com rinite refratária a tratamento medicamentoso.
- C) A complicação mais temida da septoplastia é a fístula liquórica que deve ser corrigida em um segundo tempo cirúrgico, caso não haja resolução espontânea.
- D) Hematomas septais são mais frequentes e de maior volume quando há ressecção da crista óssea maxilar ou crista palatina.

#### QUESTÃO 40

As faringotonsilites (FT) são infecções frequentes das vias aéreas superiores, principalmente na população infantil.

Com relação ao tratamento das FT, assinale a alternativa correta.

- A) O tratamento preconizado nas crises da síndrome PFAPA (febre periódica, estomatite aftosa, faringite e adenite cervical) é a associação de antibiótico com atividade contra anaeróbios, *Streptococcus* e *Staphylococcus* – como a clindamicina, com corticoide sistêmico.
- B) A condição de portador sadio assintomático do *Streptococcus pyogenes* do grupo A (cultura positiva) é indicação de tratamento, pelo risco de desenvolvimento de febre reumática e de glomerulonefrite.
- C) Na doença autoimune PANDAS (*Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections*), o tratamento das exacerbações é feito com antibióticos e tratamento neuropsiquiátrico.
- D) Devido ao aumento da resistência do *Streptococcus pyogenes* do grupo A (GAS) à penicilina no nosso meio, o tratamento de escolha das FT, com teste rápido positivo para GAS, é a amoxicilina associada ao ácido clavulânico.

#### QUESTÃO 41

A musculatura intrínseca da laringe permite movimentos rápidos e precisos, além de ajuste complexo de tensão e posturadas pregas vocais. O conhecimento das propriedades contráteis desses músculos permite compreender o papel de cada um na fisiologia laríngea.

Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta.

- A) Durante movimentos respiratórios, a contração do músculo cricotireoideo leva a um aumento do diâmetro anteroposterior da glote, enquanto o cricoaritenoides posterior leva a um aumento no sentido mediolateral; juntos promovem aumento da área glótica.
- B) A adução e o aumento da rigidez das pregas vocais, especialmente pela contração do músculo tireoaritenoides, resultam em aumento da resistência glótica.
- C) A contração do músculo cricotireoideo isoladamente tende a levar as pregas vocais para a posição paramediana.
- D) A contração do músculo cricoaritenoides lateral leva à lateralização e à elevação do processo vocal da aritenoides.

#### QUESTÃO 42

A surdez profissional se define como uma alteração coclear irreversível, consecutiva à exposição prolongada a níveis sonoros elevados, resultante do exercício da profissão.

Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta.

- A) As otoemissões acústicas e, mais particularmente, os produtos de distorção acústica permitem a triagem das alterações auditivas infraclínicas ligadas ao ruído.
- B) O déficit auditivo aparece nitidamente mais importante quando os acufenos estão presentes.
- C) Se o risco da surdez profissional aumenta de forma global com o número de anos de exposição, a nocividade do ruído sobre a audição só aparece tardiamente à exposição.
- D) A surdez de transmissão, mesmo mínima, representa uma proteção relativa contra o risco da surdez ligada ao ruído; a surdez de orelha média pode ter um efeito comparável àquele da atenuação fornecida por um protetor auditivo.

#### QUESTÃO 43

A avaliação da arquitetura do sono é indispensável na abordagem da síndrome da apneia obstrutiva do sono.

Sobre os estágios do sono, assinale a alternativa incorreta.

- A) O sono de ondas lentas ou delta predomina na segunda metade da noite e nele surgem ondas lentas de baixa amplitude.
- B) O estágio N1 do sono se caracteriza por uma diminuição de 50% da atividade cerebral da vigília e movimentos oculares lentos.
- C) A atividade cerebral da vigília se caracteriza pelo ritmo alfa com frequência entre 8 e 13 ciclos por segundo.
- D) No sono REM, a atividade cerebral é semelhante ao observado na vigília.

#### QUESTÃO 44

Analise as afirmativas a seguir sobre hipossalivação e xerostomia.

- I. A infecção pelo vírus da hepatite C deve ser considerada no diagnóstico diferencial de xerostomia e hipossalivação.
- II. O uso sistêmico do cloridrato de pilocarpina é seguro e indicado para estimular a secreção salivar em idosos com xerostomia, de modo geral.
- III. A síndrome de Sjögren é um distúrbio inflamatório crônico imunologicamente mediado que se caracteriza pela infiltração neutrofílica de múltiplas glândulas exócrinas.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III, apenas.

#### QUESTÃO 45

O papiloma invertido é um tumor epitelial benigno, mas agressivo localmente, com tendência à recidiva e à malignização.

Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta.

- A) A característica histológica fundamental é a invaginação neoplásica do epitélio para o estroma subjacente.
- B) A etiologia do papiloma invertido ainda não está bem definida, mas a mais aceita é a etiologia viral.
- C) A tomografia computadorizada é o exame de escolha para ajudar no diagnóstico e fundamental para mostrar a extensão e provável origem do tumor.
- D) A radioterapia não tem papel no tratamento do papiloma invertido, por se tratar de lesão benigna.

#### QUESTÃO 46

Analise as afirmativas a seguir, relacionadas à síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS).

- I. A circunferência cervical maior do que 43 cm no sexo masculino e do que 40 cm no sexo feminino é fortemente sugestiva de SAOS.
- II. Se a soma final da escala de sonolência de Epworth for superior a 10, pode-se afirmar que o paciente apresenta sonolência diurna excessiva por SAOS.
- III. A sonoendoscopia está idealmente indicada em todos os pacientes com SAOS grave, visto que os pacientes que fizeram esse exame tiveram melhor resultado terapêutico do que os que não fizeram.
- IV. O índice de distúrbios respiratórios corresponde ao índice de apneia e hipopneia e inclui os eventos de esforço respiratório relacionado com o despertar.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.

#### QUESTÃO 47

Epistaxe é a alteração da homeostasia do nariz causada por um comprometimento da mucosa, é bastante comum e apenas 6% exigem tratamento médico especializado.

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- A) A embolização das artérias etmoidais está indicada em sangramentos superiores persistentes.
- B) Para ligadura da artéria esfenopalatina, deve-se confeccionar retalho subperiosteal na parede lateral anterior à inserção da concha média estendendo-se posteriormente até identificar os vasos que projetam do forame esfenopalatino.
- C) A anatomia vascular nasal é complexa e as ligaduras arteriais devem ser realizadas o mais distal possível do ponto do sangramento.
- D) Raramente é manifestação inicial de tumores nasossinusais benignos.

### QUESTÃO 48

O avanço maxilomandibular (AMM) consiste na realização de osteotomias na maxila e na mandíbula para que ambos segmentos possam ser fixados em posição mais anterior.

Com relação à AMM, assinale a alternativa correta.

- A) Há evidências claras de que o AMM tem um índice de sucesso terapêutico no pós-operatório imediato semelhante a resultados a longo prazo.
- B) Para maior taxa de sucesso terapêutico, o AMM deve ser maior que 5 a 6 mm.
- C) No AMM, há a estabilização das paredes laterais da faringe, que tem efeito mais pronunciado que o deslocamento anterior da base da língua.
- D) Um dos critérios para indicação do AMM é o ângulo sela-nasion-ponto B (SNB) maior que 75°.

### QUESTÃO 49

Um grupo especial de indivíduos se destaca no uso da voz por tê-la como um de seus principais, se não o principal, instrumento de trabalho. Essas pessoas são denominadas “profissionais da voz”.

Sobre o uso profissional da voz, assinale a alternativa incorreta.

- A) Substâncias que causam amortecimento das pregas vocais, como o álcool e a cocaína inalada, aumentam os riscos de abuso vocal e de lesões traumáticas.
- B) Deve-se suspeitar de abuso vocal em pacientes que relatam fadiga associada ao uso da voz, com piora da qualidade vocal no final do dia ou no decorrer da semana, ou em pacientes com disfonia constante.
- C) A laringite aguda pode causar hemorragia ou lacerações da mucosa de revestimento das pregas vocais e, nesses casos, fica estritamente contraindicado o uso da voz.
- D) Nos profissionais da voz, a cirurgia pode ser o tratamento de escolha diante de nódulos de pregas vocais.

### QUESTÃO 50

Várias patologias orais cursam com lesões vesicobolhosas e úlceras na mucosa oral, sendo, muitas vezes, complexo o diagnóstico diferencial.

Sobre as doenças vesicobolhosas que cursam com lesões orais, assinale a alternativa incorreta.

- A) O achado histopatológico característico no pênfigo vulgar é a clivagem intraepitelial suprabasal.
- B) Os autoanticorpos encontrados no soro dos pacientes com penfigoide bolhoso não parecem se relacionar com a atividade da doença, diferente do pênfigo vulgar.
- C) O exame histopatológico é bastante característico no eritema multiforme e permite confirmar o diagnóstico.
- D) São características da necrólise epidérmica tóxica: lesões maiores que 3 cm de diâmetro, intenso acometimento mucoso, acometimento cutâneo de áreas não expostas ao sol e de mais de 20% da superfície corporal.

**GABARITO**  
**(VERSÃO DO CANDIDATO)**

01	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D		A	B	C	D
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**NÃO TRANSCREVA NENHUMA INFORMAÇÃO PARA ESTA FOLHA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**